

农作物病虫害测报

第六期

鹤山市农业农村局

二〇二六年九月四日发布

当前晚稻病虫害发生情况及防治意见

据鹤山市农业技术推广中心 9 月 1-3 日到全市水稻种植区域进行调查，我市晚稻长势良好，大部分已封行，早插田块已进入拔节末期。当前主要病虫害为稻飞虱、钻蛀性螟虫和稻纵卷叶螟。目前气候及田间环境，利于“两迁害虫”迁入繁殖。综合各监测点数据、田间调查情况、病虫害发生规律和气候特点等因素进行分析，预计后期病虫害发生程度为中等发生。

一、稻飞虱 属中等偏轻发生。据田间调查，一般田块百丛虫量约 200 头，以白背飞虱长翅型成虫为主。自 8 月 27 日起，全市各监测点相继出现灯下诱虫高峰，前期迁入虫源不断累积，需警惕稻飞虱暴发危害。当百丛若虫量达到 1000 头时，应及时开展防治。

二、钻蛀性螟虫 中等发生，主要为二化螟和大螟，在早插田块可见钻心为害，枯心率约 1%。今年早造后期的二化螟和大螟成虫基数偏高，对晚造前期影响较大。建议于水稻封行后用药防治，压低虫源基数，减轻中后期防控压力。

三、稻纵卷叶螟 属轻发生。据田间调查，9月3日在桃源镇蟠光村和共和镇里元村可见高龄幼虫及成虫。当前晚稻虫态呈世代重叠，各农户应结合自身田块虫情针对性开展防治。

四、稻瘟病 轻发生。近期持续降雨，遇适温高湿容易诱发稻瘟病。注意巡查田间发生情况，尤其历史病区应及时做好预防。

五、纹枯病 轻发生。在桃源镇早插田块偶见发生。封行后田间郁闭，近日稻飞虱数量增加，并且持续降雨天气导致田间积水和田间湿度大，极易诱发纹枯病。要密切关注该病发生情况并做好预防工作，尤其密植田块，需要重点防控。

六、防治意见

我市晚稻种植期不一致，田间水稻生育进度差异较大，加之稻纵卷叶螟世代重叠，各镇种植户应根据自身田块实际情况做好病虫害防治工作，水稻已封行的田块，建议近日用药喷施防治一次，主要防治稻飞虱和钻蛀性螟虫以及稻纵卷叶螟，兼治稻瘟病。迟插未封行田块需密切关注病虫发生情况，合理防治。如有疑问，请咨询属地农技部门。

建议农户根据自身实际情况选择合适药剂，每种病虫害只选一种药剂，选用持效期长、粘着性和展着性好的药剂，适时喷施。

防治对象和选用药剂推荐亩用量如下：

病虫害类型	推荐药剂（选择一种）
钻蛀性螟虫	杀虫双+阿维菌素、四氯虫酰胺、甲维·茚虫威（确保药剂喷施到稻株基部（稻头位置））
稻飞虱	烯啶·吡蚜酮、吡蚜·呋虫胺、噻嗪酮
稻纵卷叶螟	茚虫威、乙基多杀菌素、多杀霉素

纹枯病	井冈霉素、肟菌·戊唑醇、苯甲·丙环唑、噻呋酰胺
稻瘟病	吡唑醚菌酯、肟菌·戊唑醇、三环唑、稻瘟灵
跗线螨	螨危、哒螨灵

注意农药的轮换与交替使用，遵守安全间隔期。施药时田间保持浅水层 3-5 厘米，并保水 3-5 天，确保药效。喷药后 4 小时内遇中雨以上要及时补喷。如遇技术问题，请咨询属地农技部门。

注意保护环境，请自觉做好农药包装废弃物回收处理。